

# Pestovanie cesnaku v skratke

## NÁROKY NA STANOVIŠTE

Cesnaku najlepšie vyhovujú hlbšie, úrodné, humózne, výhrevné a dobre prevzdušnené pôdy. Nevhodne sú zamokrené, ílovité a studené pôdy. Cesnak zaradujeme do II alebo III trate. Nevhodnými predplodinami sú cibuľoviny (cibuľa cesnak), všetky plodiny ktoré majú rovnakých škodcov a choroby a plodiny ktoré majú dlhú vegetačnú dobu a nie je možné pripraviť pôdu s dostatočným predstihom, minimálne 2 týždne pred výsadbou

## KDE A AKO ZÍSKAŤ SADBŮ

Vsádzať odporúčame len uznanú sadbu, vyhnete sa tým problémom zo zavlečením chorôb a škodcov, napríklad Háďatka cesnakového ktoré Vám znemožní pestovať cesnak ale i iné cibuľoviny na zamorenom pozemku najmenej na 10 rokov.

## PRÍPRAVA SADBY

Hlávky cesnaku môžeme rozoberať už začiatkom septembra, pokiaľ budeme moriť dvojfázovo, ak budeme moriť len sulka + rovral flo stačí hlávky rozoberať až tesne pre morenie, Moríme predovšetkým proti vlnovníkovi cesnakovému a háďatku - SULKA, a proti hubovým ochoreniam ROVRAL AQA FLO, ktorým moríme vždy až po morenie sulkou. Pre lepšiu rast môžeme cesnak ešte ošetriť biologickými preparátmi napr., GLIOREX, ktorý obsahuje spory hub, ktoré sa vyskytujú v pôde. Pomáhajú bujnejšiemu rastu koreňovej sústavy a tým aj zvýšenému príjmu živín a tým rastu väčších cibúľ.



## PRÍPRAVA PODY

Pôdu pripravujeme najmenej 2-3 týždne pred výsadbou. Pozemok je potrebné preorať resp. zryľovať vyhnojiť viaczožkovým bezchloridovým hnojivom s mikroprvkami (napr. CERERIT), dávka cca 800kg/ha. Vhodnejšie je však hnojenie na základe pôdných rozborov, je presnejšie a nedochádza k prehnojeniu pôdy. Pri spracovaní pôdy môžeme ešte zapracovať dusikaté vápno, ktoré pôsobí dezinfekčne aj ako hnojivo.



## VÝSADBA

Cesnak sadíme do riadkov od seba vzdialených 25-40cm. Vzdialenosť riadkov volíme podľa spôsobu agrotechniky a využiteľnej mechanizácie. Vzdialenosť v riadku by mala byť 8-12 cm. Strúčiky sadíme tak aby nad strúčikom bolo 6-8 cm pôdy teda do hĺbky 8-10 cm. Strúčik musí byť orientovaný podpučím dole. Pôdu pred výsadbou nakypríme do hĺbky asi 10 cm, uľahčíme tým zakoreňovanie a rozvoj koreňovej sústavy, a zároveň zabránime vyťahovaniu strúčikov mrazmi. Cesnak vysádzame čo najneskôr, s výsadbou môžeme podľa priebehu začať od polovice októbra a pokračovať až do zamrznutia pôdy. Teplota pôdy by mala byť pod 8°C, aby cesnak iba zakorenil ale už ďalej nerástol a zároveň teploty pod 8°C sú najspôhlivejšou ochranou proti Fuzariu. Po výsadbe je potrebné vysadenú plochu uvalcovať.

## AGROTECHNIKA

Počas celého vegetačného obdobia rozrušujeme povrch pôdy aby sa nevytváral prísušok. Zároveň je potrebné dbať i na čistotu porastu. Kultiváciu nevykonávame hlboko aby nedochádzalo k poškodzovaniu koreňov rastlín. Čím je pôda ilovitejšia a ťažšia tým je väčšia pravdepodobnosť tvorby prísušku, hlavne po väčších dažďoch.



## ZÁVLAHA

Aj keď cesnak neaparí medzi vyslovene náročné plodiny na vodu je potrebné ho v suchých obdobiach zavlažovať. Najvyššie nároky cesnaku na vodu sú od polovice mája do polovice júna.

## HNOJENIE

Počas s vegetácie je potrebné cesnak prihnojovať, dôraz kladieme na dodanie dusíka. Prihnojovať môžeme liadkom vápenatým (15%N), prípadne síranom amónnym (20%N), ktorý súčasne dodá i potrebnú síru. Prvú dávku aplikujeme skoro na jar hneď pri obnovení rastu, a ďalšie dávky by mali byť aplikované každé 3-4 týždne, resp. je možné dávku dusíka rozdeliť do menších dávok a aplikovať aj každý týždeň, avšak celková dávka by nemala prekročiť 0,5-0,6kgN /100m<sup>2</sup>. Posledné prihnojenie by sme mali vykonať najneskoršie asi týždeň odhlávkovaní, teda po odstránení stvolov s pacibuľkami.



## Ochrana proti škodcom


Jedným z najväznejším škodcom pri pestovaní cesnaku je Fúzavka cesnaková. Postrek vykonávame skoro na jar, ak máme po sebe idúce tri dni, s teplotami nad 10oC. Druhú aplikácia vykonávame za 14 dní po prvej.

## Hlávkovanie

U paličákov je potrebné včasné odstránenie kvetných stvolov s pacibuľkami. Neskoré odstránenie alebo ponechanie znamená vo veľmi výraznej miere zníženie úrody. Cibule môžu byť menšie až o 50%.

## Zber a sušenie

Pre dobrú úrodu je potrebné stanoviť aj správny termín zberu cesnaku. Skorý zber znamená nevyzreté cibuľa, neskorý zas rozpadajúce sa cibule. Vhodný termín zberu môžeme určiť následovne :



- a) ponechať niekoľko neodhlávkovaných rastlín Zberáme, keď sa začne stvol s pacibuľkami vyrovnávať
- b) druhou možnosťou je, že zo zberom začíname keď na cesnaku zostane 5 dužinatých listov (môžu byť i žlte).
- c) Poslednou a asi najspôhlivejšou metódou je zber podľa počtu šupiek na cibuli. Je potrebné vykopať niekoľko cibúľ (nie z jedného miesta), a spočítať počet šupiek, u paličákov je to 4-5 šupiek, u nepaličákov 3-4 šupky čo obyčajne býva keď poľahne cca polovica rastlín .

Oneskorený zber ma za následok rozpadávanie hlavičiek na strúčiky či už pri zbere alebo pri manipulácii. Cesnak po zbere dobre očistíme a sušíme ho. Najlepšie je dosúšať aj s vňaťou alebo podstatnou časťou vňati, na mieste s dobrým prúdením vzduchu . Cesnak nesúšime na priamom slnku, pri vyšších teplotách môže prísť s sklovateniu cesnaku. Po dosušení vňať skrátíme , korene odstraňujeme už pri zbere alebo po dosušení, striháme ich na dĺžku cca 0,5cm. Z cibule odstránime poškodené suknicie a uložíme do debničiek alebo rašlových vriec. Skladujeme ho na dobre vetranom a čo najchladnejšom mieste s nízkou vlhkosťou aby nám nezačal klíčiť.

**PESTUJEME PRE VÁS SLOVENSKÝ CESNAK – [www.biokonzult.sk](http://www.biokonzult.sk)**

Množstvo informácií pre Vás, ale i sadbový, konzumný cesnak a potreby k pestovaniu si môžete kúpiť v našom e-shope **rýchlo a pohodlne**